Tabela 21

Główne rasy bydla użytkowane w Polsce

RASA	Masa ciała - kg	Wysokość w kłębie	Dojrzałość hodowlana	Mleczność matek	Masa cieląt przy urodz.	Przyrosty dzienne – g
Hereford	750	130	15 m-cy	średnia	30-33	ok.1000
Aberdeen Angus	600	125	15 m-cy	średnia	27-30	900-1000
Charolaise	800	140	15 m-cy	dobra	40-45	1200-1500
Limuosine	650	135	16-20 m-cy	zadowalajaca	35-40	1100-1300
Blonde D" Aquitane	650	135	18-24 m-ce	dobra	40-45	1200-1300
Salers	650	140	15 m-cy	b.dobra	35-40	ok.1000
Piemontese	600	140	16-18 m-cy	b.dobra	35-40	ok.1000
Simental (typ mięsny)	800	140	18-24 m-ce	dobra	40-45	1200-1400
Holsztyńsko fryzyjska(czarnobiała)	650	140	15-17 m-cy	ok.6000	40	x
Jersey	400	124		ok.4700	20-25	x
Czerwono biała	600	127	ok.15-17 m-cy	ok.5900	35-40	x
Polska czerwona	450	126	ok.18-19 m-cy	ok.3800	35-40	x
Simental (typ mleczny)	650	135	ok.15-17 m-cy	ok.4400	35-40	ok.1200
Białogrzbieta	b.d	b.d	b.d	ok.3100	35-40	x
Montbeliarde	650	145	b.d	ok.5600	40-45	x

Poradnik producenta żywca wołowego - pod.red. H. Jasiorowskiego

Wyniki oceny użytkowości bydła za rok 2004, KCHZ;