Tabela 30

Przykłady dawek pokarmowych dla intensywnie opasanych buhajków w oparciu o kiszonkę z kukurydzy

Masa ciała kg	Kiszonka z zawartością do 25% s.m.		Kiszonka z zawartością ponad 25% s.m.	
	Dobowe spożycie pasz w kg		Dobowe spożycie pasz w kg	
	Pasza treściwa*	Kiszonka	Pasza treściwa**	Kiszonka
Przewidywane przeciętne dobowe przyrosty m.c.-1000g **(wariant I)**				
125-175	1,5	8	1,0	8
176-225	1,5	12	1,0	11
226-275	1,5	15	1,0	14
276-325	1,5	19	1,0	17
326-375	1,5	23	1,0	20
376-425	1,5	25	1,0	22
426-475	1,5	26	1,0	23
476-525	1,5	27	1,0	24
526-575	1,5	28	1,0	25
Przewidywane przeciętne dobowe przyrosty m.c.-1100g (**wariant II)**				
125-175	2,0***	7	1,5**	7
176-225	2,0	11	1,5	10
226-275	2,0	15	1,5	14
276-325	2,0	19	1,5	17
326-375	2,0	22	1,5	20
376-425	2,0	23	1,5	21
426-475	2,0	25	1,5	22
476-525	2,0	26	1,5	23
526-575	2,0	27	1,5	24