Tabela 44

Orientacyjne zapotrzebowanie na pasze pełnoporcjowe dla lochy w 1 cyklu produkcyjnym oraz zapotrzebowanie roczne (2 mioty w ciągu roku, średnia wartość pasz) - kg/szt

Faza cyklu	Dni żywienia	Śr.dawka dzienna-kg	zużycie kg paszy przy liczbie prosiąt w miocie			
			6 szt	8 szt	10 szt	12 szt
Ciąża 1 - 90 dni	90	2,25	203	203	203	203
90 - 110 dni	20	3,15	63	63	63	63
110 - 114	4	2	8	8	8	8
Razem ciąża	114		274	274	274	274
Laktacja, w tym						
- bytowe matki	42	2	84	84	84	84
- 1 karmione prosię	42	0.47	118	158	197	237
Razem laktacja	42		202	242	281	321
Luźność i krycie	26	2,6	68	68	68	68
Razem w cyklu	182		544	584	623	663
Rocznie około	365		1080	1170	1250	1330
Rocznie prosiąt od lochy			12	16	20	24

W zimnym pomieszczeniu - dodatek paszy treściwej do 0,5 kg dziennie.

Dla loch niskoprośnych dodatek pasz balastowych (słoma, siano) do 0,5 kg dziennie, lub zielonka - w chlewniach ściolowych ściołowych wskazany, w bezściolowych niezbędny

Na podstawie "Norm żywienia świń 1993"