Tabela 53
Kalendarz fermy jeleni

Styczeń	Możliwy test Tb/bruc. Kontrola wagi łań. Dodatkowe dawki pasz dla lżejszych łaniek. Niskie dawki pasz treściwych, sianokiszonka lub siano do woli. Zwiększenie treściwych do 50% w czasie silnych mrozów.
Luty	Możliwy test Tb/bruc. Żywienie jak w styczniu.
Marzec	Możliwy test Tb/bruc.Stopniowe zwiększenie dawki pokarmowej (dłuższy dzień) - objętościowe cały czas do woli, treściwe o 1/2 więcej
Kwiecień	Możliwe szczepienie przeciw clostridium. Odrobaczenie tydzień przed wyjściem na pastwisko. Dalsze zwiększanie treściwych, nawet do dwukrotnej dawki styczniowo - lutowej.
Maj	Łanie na najlepsze pastwisko, odpowiednio duże tak by starczyło na cały okres wycieleń. Pastwisko, rotacja po kwaterach. Rutynowe odrobaczanie co miesiąc.Ewentualne uzupełnienie pastwiska dobrą sianokiszonką lub owsem, jeśli to konieczne
Czerwiec	Obserwacja wycieleń, identyfikacja łań jałowych, późno się cielących, najlepszych matek (najwieksze cielaki). Pastwisko. Pastwisko, rotacja. Rutynowe odrobaczanie.
Lipiec	Kontynuacja. Możliwe letnie odrobaczanie całego stada.
Sierpień	Obcinanie byków tuż po wytarciu poroża. Możliwe odrobaczanie byków i szczepienia na clostridium. Pastwisko, rotacja. Rutynowe odrobaczanie. Główny ubój pod koniec miesiąca. Ewentualne wprowadzenie pasz treściwych dla łań w celu nauki ich pobierania przez cielęta co zmniejsza późniejszy efekt stresu przy odłączeniu cieląt.
Wrzesień	Odłączenie cieląt, sortowanie łań w grupy do krycia. Możliwy test TB/bruc, odrobaczenie. Przydzielenie byków do grup łan. Wskazane dodatkowe dawki pasz dla wyrównania kondycji łań i zwiększenie szans pokrycia. Identyfikacja łań jałowych, ewentualne ich wycofanie. możliwe odłączenie cieląt (I termin), z możliwym pierwszym szczepieniem na clostridium. Wazenie cieląt, odrobaczanie.
Październik	Krycia. Asekuracyjne wycofanie (po dwóch cyklach, czyli 36 dniach) głównych byków i zastępowanie ich innymi w celu zwiekszenia pewności pokrycia wszystkich łan. Cielęta odłączone - na pastwisku z pasza tresciwą. Nie odłączone - z łaniami. Możliwe odrobaczanie.
Listopad	Grupowanie na kwaterach zimowych. Wysokie dawki pasz tresciwych dla byków, szczególnie kryjących. Konieczne odrobaczanie całego stada na początku miesiąca (jeśli nie było robione wcześniej). Odłaczanie cieląt przed zimą (II termin) wysokie dawki pasz tresciwych w celu wykorzystania dużego potencjału przyrostów. Dodatkowe dawki premiksów mineralno - witaminowych.
Grudzień	Średni poziom żywienia. Możliwy test Tb/bruc. Żywienie jak wyżej.

Tb/bruc - test na gruźlicę (Tb) i brucelozę

Źródła: Różne