Tabela 66

Średnie parametry technologiczne dla chowu i hodowli niektórych gatunków roślinożernych zwierząt futerkowych

Wyszczególnienie	SZYNSZYLE	NUTRIA	KRÓLIKI
Ilość miotów od 1 samicy stada podstawowego	2	2	3-4
Ilość młodych w 1 miocie (szt)	2-3	4-6	6-10
Masa ciała przy urodzeniu (w g)	30-60	170-250	50-90
Ilość dni od urodzenia do odsadzenia	28-42	42-49/56 *	35-56
Masa ciała przy odsadzeniu (w g)	150-200	700-1200	800-1000
Dojrzałość rozpłodowa (miesiące)			
samców	10-12	8-9	5,5-8
samic	10-12	7-8	4,5-7
Długość ciąży (w dniach)	105-111	128-132	33
Okres użytkowania samic w latach (uzasadniony)	6-8	3-4	3
Okres użytkowania samców w latach (uzasadniony)	2-4	3-4	3-4
Ilość samic na 1 samca (stosunek poligamii)	5:1	12:1	8:1
Upadki %			
sztuki dorosłe	2	1-2	15
młodzież	3-10	10-15	8
Zużycie paszy treściwej na 1 szt /rok (kg)			
sztuki dorosłe	7-9	40-45	100
młodzież	4-5	14-15	9
Zużycie paszy objętościowej (siana) na 1 szt/rok (kg)			
sztuki dorosłe	9-12	4,5-5	ściołowanie
młodzież	5-9	2,0-2,5	
Zużycie paszy objętościowej (zielonki) na 1 szt/sezon (kg)			
sztuki dorosłe	jako dodatek	150-160	dodatek
młodzież		90-120	smakowy

* chów ekstensywny

Źródło : Chów i hodowla zwierząt futerkowych;J.Kuźniewicz;A.Filistowicz;WAR Wrocław;1999