Tabela 4. Podstawowe dane agrotechniki roślin motylkowych

Roślina uprawna	Termin siewu		Obsada roślin	Wysiew	Szerokość	Nawożenie			Orientacyjny plon dt/ha		Termin zbioru
	optymalny	dopuszczalny	w szt/m2	w kg/ha	między w cm.	N	P.	K	główny	uboczny	
Strączkowe na nasiona											
Łubin żółty	25.III-10.IV	2/IV	90-100	120-160	20-25	0-15	60-80	80-100	8 do24	30-60	5.VIII-10.IX
Łubin biały	25.III-10.IV	2/IV	70-80	230-250	20-25	0-15	60-80	80-100	15-40	70	10.VIII-25.IX
Łubin wąskolistny	25.III-10.IV	2/IV	90-100	130-160	20-25	0-15	60-80	80-100	12 do 25	60	15.VII-31.VIII
Groch siewny	10.III-30.III	1/IV	80-120	140-300	15-20 cm	20-30	30-80	60-120	15-30	35-60	20.VII-20.VIII
Bobik	20.III-10.IV	do 25.IV	50tradycyjne 65samokoń	220-300	20-30	30-40	80-120	140-180	40-60	80-120	IX
Wyka jara	20.III-10.IV	do 15 .IV	200	100-130	około 20 cm		60-80	80-100	15-20	30-50	20-30.VIII
Wyka ozima drobnonasienna	2-3/III	1/IV	80-100	80-100	20-25		60-80	80-100	15-30	30-60	2/VIII
Lędźwian - średnionasienny	2-3/III	1/IV	80-100	160-200	20-25		60-80	80-100	15-30	30-60	2/VIII
- grubonasienny	2-3/III	1/IV	80-100	250-300	20-25		60-80	80-100	15-30	30-60	2/VIII
Soczewica - wielkonasienna	do.30.III do	1/IV	200-250	130-180	15-20		40-60	60-80	5 do 15	5 do 15	2/VIII
Soczewica - drobnonasienna	30.III	1/IV	250-300	60-90	15-20		40-60	60-80	5 do 15	5 do 15	2/VIII
Soja	20.IV-10.V	2/V	pow. 80	140-180	15-25 lub 35-40 mech.	30-60	60-80	80-120	15-25	20-25	3/VIII
Seradela	20.III-10.IV	2/IV	300	30-40	15		40-60	80-120	0.5-1	od 3 do 6	2/VIII
Strączkowe na zielonkę											
Łubin żółty	10.IV-30.IV		125	180-200	20	0-30	60-80	120-160	350-450		VII
Łubin wąskolistny	10.IV-30.IV		125	170-200	20	0-30	60-80	120-160	200-350		VII
Łubin biały	10.IV-30.IV		125	280-350	25	15-40	60-80	120-160	200-350		VII
Seradela	10.IV-20.IV		400	40-50	15		30-80	60-120	150-250		VII
Wyka jara	10.IV-30.IV		200-300	140-160	20	20-30	50-80	100-160	200-300		VII
Bobik	10.V-30.V		60-70	240-300	20	20-30	80-100	160-200	350-500		VIII
Motylkowe drobnonasienne na zielonkę											
Koniczyna czerwona	20.III-20.IV			16-18	18-20		80-100	120-160	200-400		20.V-10.IX
Koniczyna biała	20.III-20.IV			8 do 12	10 do 15		50-80	80-120	120-160		pastwisko
Koniczyna szwedzka	20.III-20.IV			8 do 12	12 do 15		50-80	120-160	250-350		10.VI-20.IX
Koniczyna perska	10.IV-10.V			15-18	10 do 15		50-80	120-160	300-600		10.VI-20.IX
Lucerna	10.IV-30.V			15-20	12 do 15		90-120	160-240	300-600		20.V-10.IX
Komonica	20.III-10.IV			10 do 15	15 do 20		50-80	80-120	150-500		VI-VIII
Esparceta	20.III-20.IV			60	20		30-60	60-100	150-240		VI-VIII
Seradela	20.III-10.IV			40-50	15-18		50-80	50-120	150-250		lipiec
Motylkowe drobnonasienne na nasiona											
Koniczyna czerwona	20.III-20.IV			8 do 12	20-25		80-100	120-160	2 do 5	10 do 20	wrzesień
Koniczyna biała	20.III-20.IV			6 do 8	25-30		50-80	120-160	2 do 4	7 do 10	lipiec
Koniczyna szwedzka	20.III-20.IV			6 do 8	30-40		50-80	120-160	2 do 5	10 do 20	lipiec
Lucerna	10.IV-30.V			4 do 8	40-60		90-120	160-240	2 do 5	20-30	lipiec

Źródło :różne *zapis1-3/IV oznacza pierwsza do trzeciej dekady kwietnia; zapis 25.VII oznacza 25 lipca
IHAR Radzików 2002r. - " Soja" dr Lech Boros HR Strzelce - Bobik