Tabela 2. Wartość przedplonowa różnych roślin dla zbóż

Przedplon	ROŚLINY NASTĘPCZE						
	jęczmień ozimy	żyto	pszenica ozima	jęczmień jary	owies	pszenica jara	pszenżyto ozime
Jęczmień ozimy	N		N	N		N	
Żyto			N	3		N	N
Pszenica ozima			N	3		N	
Jęczmień jary			N	N	2		
Owies				2	N		
Pszenica jara			N			N	
Kukurydza		1	1				
Rzepak							
Groch							
Bobik							
Łubin							
Ziemniak wczesny							
Ziemniak śr. późny							
Ziemniak późny							
Buraki cukrowe							
Lucerna							
Koniczyna z trawą							
Trawy							

	b. dobry - 100%*	O	warunkowo możliwy - 85-95%
	dobry - 95%	N	zły- 75-80%
	możliwy - 88-92%		następstwo nie stosowane w praktyce

Kuś J. :Rola zmianowania roślin we współczesnym rolnictwie. Wyd. IUNG Puławy, 1995

1/ - w kukurydzy powinno się stosować herbicydy szybciej rozkładające się w glebie
2/ - częste stosowane może spowodować namnażanie się nicieni w glebie
3/ - wskazana jest uprawa poplonów na przyoranie

*W % podano oczekiwany poziom plonu w stosunku do przedplonów b. dobrych