Tabela 21. Klasy wartości użytkowej (Lwu) ważniejszych gatunków roślin użytków zielonych

Lwu -10		Lwu -8	Lwu -7	Lwu -6	Lwu -5	Lwu -4
Kostrzewa łąkowa	Konietlica łąkowa	Stokłosa bezostna	Mozga trzcinowata	Grzebienica pospolita	Drżączka średnia	Owsica omszona
Tymotka łąkowa	Kupkówka pospolita	Wiechlina błotna	Perz właściwy	Kostrzewa czerwona rozłogowa	Kłosówka wełnista	Stokłosa miękka
Wiechlina łąkowa	Mietlica biaława	Groszek żółty	Wiechlina zwyczajna	Kostrzewa trzcinowa	Kostrzewa czerwona kępkowa	Tomka wonna
Życica trwała	Rajgras wyniosły	Koniczyna rozdęta	Koniczyna drobnogłówkowa	Mietlica pospolita	Manna mielec	Barszcz zwyczajny (ponad 5%)
Koniczyna biała	Wyczyniec łąkowy	Lucerna nerkowata	Wyka płotowa	Wiechlina roczna	Stokłosa prosta	Brodawnik zwyczajny (ponad 5%)
	Życica wielokwiatowa		Babka lancetowata (do 5%)	Koniczyna pogięta	Wyczyniec kolankowaty	Dzwonek rozpierzchły
	Komonica błotna		Brodawnik jesienny (do 5%)	Wyka ptasia	Koniczyna pagórkowa	Krwawnik pospolity (ponad 5%)
	Komonica zwyczajna		Kminek zwyczajny (do 5%)	Barszcz zwyczajny (do 5%)	Przelot pospolity	Krwiściąg lekarski (ponad 5%)
	Koniczyna białoróżowa		Przywrotnik pospolity (do 5%)	Brodawnik zwyczajny (do 5%)	Babka lancetowata (ponad 5%)	Marchew zwyczajna
	Koniczyna łąkowa			Krwawnik pospolity (do 5%)	Brodawnik jesienny (ponad 5%)	Mniszek pospolity (ponad 5%)
				Krwiściąg lekarski (do 5%)	Kminek zwyczajny (ponad 5%)	Ostrożeń warzywny
				Mniszek pospolity (do 5%)	Kozibród łąkowy	Pasternak siewny (ponad 5%)
					Pasternak siewny (do 5%)	Pępawa dwuletia
					Przywrotnik pospolity (ponad 5%)	Rogownica pospolita
					Rdest wężownik (do 5%)	Szczaw łąkowy
						Trybula leśna
						Wiązówka błotna

Lwu -3	Lwu -2	Lwu -1	Lwu -0	Lwu - (-1)	Lwu - (-2)	Lwu - (-3)
Kostrzewa owcza	Bliźniczka psia trawka	Bluszczyk kurdybanek	Dziewięćsił pospolity	Cieciorka pstra	Skrzyp bagienny	Tojad dzióbaty
Śmiałek darniowy (do 10%)	Izgrzyca przyziemna	Firletka poszarpana	Ostrożeń błotny	Knieć błotna	Skrzyp błotny	Szalej jadowity
Chaber łąkowy	Trzęślica modra	Jaskier ostry	Ostrożeń polny	Rzeżucha łąkowa	Wilczomlecz sosnka	Zimowit jesienny
Przetacznik żankowy	Babka zwyczajna	Kosmatka polna	Skrzyp błotny	Świetlik łąkowy		
Przytulia pospolita	Bodziszek łąkowy	Kozłek lekarski	Sit rozpierzchły	Len przeczyszczający		
Rdest wężownik (ponad 5%)	Dziurawiec czteroboczny	Ostrożeń łąkowy	Śmiałek darniowy ponad 25%)	Wrotycz pospolity		
	Głowienka pospolita	Rdest ptasi	Turzyca zaostrzona (ponad 10%)			
	Jaskier rozłogowy	Sit członowaty	Wrzos zwyczajny			
	Niezapominajka błotna	Sitowie leśne				
	Szczaw tępolistny	Stokrotka pospolita				
	Turzyca owłosiona	Śmiałek darniowy (10-20%)				
	Turzyca prosowata	Turzyca pospolita				
	Złocień właściwy	Turzyca zaostrzona (do 10%)				
		Wełnianka wąskolistna				

Lwu - liczba wartości użytkowej roślin 10-9 - bardzo dobra; 8-7 - dobra; 6-4 - średnia; 3-1 – mała; 0 - rośliny nieuchwytne dla kosy i pomijane przez zwierzęta; (-1) -(-3) - rośliny trujące Źródło: System klasyfikacyjny Filipka 1973