Tabela 29. Optymalny termin koszenia łąk (I pokos) w zależności od cech biologicznych przeważających w runi gatunków traw

Gatunek trawy	Liczba dni od początku rozwoju wiosną		Pora kwitnienia	Optymalny termin koszenia	
	kwitnienia	do dojrzewania nasion		faza rozwojowa	miesiąc
Wyczyniec łąkowy	50-60	70-75	połowa maja	po wykłoszeniu się, przed zakwitaniem	połowa maja
Kupk.ówka pospolita	60-65	80-85	początek czerwca	po wykłoszeniu się, przed zakwitaniem	II połowa maja
Rajgras wyniosły	65-70	85-90	początek czerwca	po wykłoszeniu się, przed zakwitaniem	II połowa maja
Mozga trzcinowata	65-70	80-85	początek czerwca	w poczatkach kłoszenia	II połowa maja
Kostrzewa czerwona	60-65	80-85	początek czerwca	po wykłoszniu	II połowa maja
Kostrzewa łakowa	65-70	80-90	połowa czerwca	w początkach kwitnienia	początek czerwca
Stokłosa bezostna	75-80	95-100	koniec czerwca	w czasie kłoszenia	połowa czerwca
Wiechlina błotna	75-80	95-100	koniec czerwca	w czasie kłoszenia	połowa czerwca
Tymotka łąkowa	75-85	100-110	początek lipca	po wykłoszeniu się, w początkach kwitnienia	II połowa czerwca
Mietlica biaława	70	95	I połowa lipca	w początku kwitnienia	II połowa czerwca

Źródło: T. Kocan, K. Janicki Uprawa łąk i pastwiski W-wa 1972.